
DISPUTATIO MEDICA

DE

PHTHISI PULMONALI.

DISPUTATIO MEDICA
IN AUGURALLIS

DE

PHTHISI PULMONALI;

AVVM.

ANNUNTIUM

EX LIBRARIIS

D. GEORGI BARRI D. M. P.

MADEIRA

Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

EDINBURGI

EXCUBANT ADAMUS REILL ET SOCIUM

M DCCC

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

DE

PHTHISI PULMONALI;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,

D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu; et
Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto;

PRO

GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

JOANNES MITCHELL, A. M.

SCOTUS.

Ad diem 24. Junii, horâ locoque solitis.

Quò fugit Venus? heu! quòve color decens?

Quò motus? quid habes illius, illius,

Quæ spirabat amores?

Quæ me surpuerat mihi. —

HOR.

EDINBURGI:

EXCUDEBANT ADAMUS NEILL ET SOCII.

=====
M DCCCI.

DAVIDI HUNTER BLAIR,

BARONETTO, DE BROWNHILL,

ET

JACOBO HUNTER BLAIR,

ARMIGERO, DE DUNSKEY,

INGENUIS MAGNÆQUE SPEI ADOLESCENTIBUS,

FAMILIA ANTIQUA, HONESTISSIMAQUE,

(DEUM OBSECO UT PATREM REFERANT !)

HAUD MINUS ANIMI DOTIBUS,

VITÆ INTEGRITATE,

ET SUMMA AMORE ERGA PATRIAM SUOSQUE,

ORNATIS ;

DISCIPULIS QUONDAM CARIS,

AMICIS NUNC FIDELIBUS,

PATRONIS ETIAM,

DULCIQUE DECORI MEO,

HANC

DISSERTATIONEM INAUGURALEM,

ANIMI GRATI OBSERVANTISSIMIQUE

TESTIMONIUM,

D. D. CQUE

JOANNES MITCHELL.

DISPUTATIO MEDICA

JACOBO HUNTERE BRIT.
IN AUGURALIS

ERRATA.

Pag. 20 lin. 16 *pro nulla lege nullus*

28 13 foli sole

40 1 jucunda jucundi

De pathit pulmonar, partit due ex auc-
toribus optimis collegi, partim due
egomet vidi, pauca discreta in animo est.
Morbus enim, sub vestro fore praxitio, hanc
taro occurrat, et nemini omnium fortasse vix
tam laeta et secunda non, ut amicum habent.
aut propinquum carum, hoc posse ad interos
militar, non debiderat, atque plorat.

Juvenes

A

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

PHTHISI PULMONALI.

DE phthisi pulmonali, partim quæ ex auctoribus optimis collegi, partim quæ egomet vidi, pauca differere in animo est. Morbus enim, sub nostro Jove præsertim, haud rarò occurrit; et nemini omnium fortasse vita tam læta et secunda fuit, ut amicum fidelem, aut propinquum carum, hâc peste ad inferos missum, non desiderat, atque plorat.

A

Juvenes

Juvenes vix togam virilem assumpserunt, quum n hunc morbum incidendi est periculum. Nec puellæ jam viris maturæ, magis in tuto positæ sunt. Cum utroque sexu, quindecim aut sedecim nato, donec triginta pluresve annos compleverint, bellum mœstuosum gerere solet.

Immò, si quis ingenio, animi dotibus, aut formâ, aut pulchritudine sit insignis, hanc pestem præter alios timeat et caveat; præcipue iis anni temporibus, quum cœlum maximè variat, nunc calet, nunc friget, rores imbresque cadunt. Qualis hujus morbi, a carcere usque ad metam sit progressus, aut historia ejus; quæ sint causæ; qualis diagnosi, et prognosis; postremò quæ sit ratio medendi, breviter exponere mihi proposui.

HISTORIA MORBI.

PHTHISIS Pulmonalis, a cel. CULLENO, de humano genere optimè merito, sic definitur:

“ Corporis

“ Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi, febre hectica, et plerumque expectoratione purulenta.”

Idem auctor in duas dividit species, nempe, Incipientem et Confirmatam. Pace autem tanti viri, magis fortasse convenit, has species, stadia solum ejusdem morbi diversa haberi. Nonnullis etiam placuit stadia notare tria, quibus nomina Tuberculoso, Inflammato, Ulcerato, indita fuerunt. Sed hæc divisio quid ad rem attinet? quoniam sua signa cuique stadio accuratè tribuere non possumus, et quoniam, ut multi credunt, phthisis omninò sine tuberculis adfit. In enumerandis igitur signis morbi, de quo agimus, stadia notare duo, viz. Incipiens et Confirmatum, potius fert animus.

In stadio incipiente, adest quædam pulmonum titillatio, quæ tussim brevem, plerumque siccam, nonnunquam spumofam, frequenter ciet. Respiratio, adhuc, satis libera manet, aut tantùm paululùm celerior, et difficilior evadit, quam curritur, aut in locum editum

tum ascenditur. Est autem dolori, inspiratio plenior, motus artuum, et corporis exercitatio labori; ponderis in quadam parte thoracis, in latere, sæpe sub sterno, adest sensus; et totum pectus quasi chordis astringi videtur.

Æger non ludis neque exercitationibus solitis gaudet, foras ambulare recusat, animum ad negotia sua, ut olim, tendere non curat; languor enim et debilitas ejus membra occupaverunt. Veruntamen satis hilaris est, nil timet, catarrho solo laborare sibi persuadet; et secundæ valetudinis citò redituræ, spem pacit inanem. Nec mens sibi fallere videtur; nam identidem, tussis rariùs vexat, pectus minùs dolet, pulmones liberè et impunè vescuntur aura. At haud longum post intervallum, aut sine ulla causa evidente, aut frigore corpori admoto, omnis turba malorum revertitur; mox iterum gradum refert, mox iterum impetum facit.

Per complures menses, aut etiam annos, res ita se habent; et æger nec secundâ nec magnoperè adversâ fruitur valetudine. Tandem
autem

autem omnia ingravescent; tussis sæpius urget; respiratio fit majori oneri, atque labori. Dolores primò fugaces, et lanceolæ puncturæ similes, fixi in alto pectore manent. Expectoratio adhuc nulla, vel minima, magnoperè augetur; nunc viridis, nunc flava, sæpe crassa, et sanguine striata. Pulsus fit celer, aliquando plenus et fortis, plerumque parvus atque debilis. Morbo ita progrediente, alvus ferè adstricta est, appetitus cibi variat, interdum nausea et vomitus adfunt, sæpe dolor est capiti, et decubitus in uno vel altero latere difficilis.

Tum demum febris hæctica, novâ cohorte malorum comitante, accenditur, et nunc omnia indies in pejora ruunt. CULLENUS, in definitione hæcticæ, his verbis utitur aptissimis: “Febris quotidie revertens, accessionibus meridianis, et vespertinis, remissione, rariùs apyrexia matutinâ, plerumque sudoribus nocturnis, et urina sedimentum furfuraceo-lateritium deponente.” Febrem hæcticam, duas accessiones, viz. meridianam et vespertinam, singulis diebus

diebus habere, multis persuasum est. Meridiana autem accessio aut nulla est, aut adeò levis, ut vix notare licet; at sine dubio paroxysmum vespertinum adesse oportet.

Ordine febris non turbato, infelix reverà calidior, sensu frigoris laborat, atque horrefcit; mox omnis calet, præsertim manuum volæ, plantæque pedum. Tandem luce appropinquante, si morbus inveteraverit, sudor, nomine *colliquativus*, nunc circa caput, aut pectus, rarò ubique æqualiter, manat. Per longam noctem æger sic laborat; interdum brevi somno fruitur; et, mirabile dictu, animo hilari et spei pleno manè surgit. Haud longa autem est requies; nam circa meridiem hæctica recurrit, et quatuor aut quinque horas, ut antea, vexat infelicem.

Dum hæc aguntur, pulsus plerumque exilis, et debilis, fit adeò frequens, ut temporis minuto, ad centies et vicies, aut etiam sæpius, micat. Genæ aliàs pallidæ, ruboribus circumscriptis rutilæ splendent.

Paroxysmus

Paroxyſmus autem hec̄ticus, non ſemper hunc curſum ſequitur regularem. Modò æger tantùm horrefcit, modò quum horruerit protinùs infudat; modò calet, nec præeunte algore, nec ſequente ſudore; modò etiam ſine frigoris calorisve ſenſu, copioſus ſudor promovetur; interdum ſudore peracto, febre haud abeunte, horror de integro redibit. De hac re, (ſi ejus verbis uti fas ſit), ita loquitur HERDEN: “When the ſweat is over, the fever will ſometimes continue, and in the middle of the fever the chilneſs will return, which is a moſt certain mark of this fever. Almoſt all others begin with a chilneſs, but the return of it, ſo as to laſt half an hour or longer, while the fever is ſtrong upon the patient, is what I have never ſeen, except only in this fever.” Quos vexat hec̄tica, ab eodem accepimus, ii interdum per complures dies, bonâ valetudine fruuntur; ſaltem paroxyſmi adedò non moleſti ſunt, ut æger a morbo prorfùs vacare ſibi perſuadet. Paroxyſmi va-
gi ſæpius eodem die nonnunquam videantur;
qui

qui tamen, ut primi hecticæ conatus, aut phthisi ingravescente, fortuitæ morbi exacerbationes, ex cibo incauté sumpto aliisve causis excitantibus habeantur.

Ineunte hecticâ, alvus plerumque adstricta est; proveciore autem, diarrhœa colliquativa, cum sudore alternans, ægrum exhaurit. Cutis, nisi sudore manante, ficca, dura, et pallida est. Per linguam et fauces internas, primò fatis humidas, læves atque nitidas, aphthæ apparent. Halitûs fœtor ferè intolerabilis est. Insignia mœsta faciei Hippocraticæ totum vultum deformant. Cava sunt lumina; tunicæ conjunctivæ subalbido sunt colore, et margaritæ simili; pupillæ dilatantur; alæ nasi porriguntur; genæ nunc squalidæ, nunc partim rutilæ, acuuntur, tantâque atrophîâ absumuntur, ut ossium formam, præcipue maxillæ, planè licet videre. Summa macies est fronti, et sudor frigidus guttatim distillans; capilli decidunt; fæces liquidæ et perfœtidæ, clam ægrotum fluunt.

Nunc

Nunc omnes functiones languent. Mens aliena, deliraque evadit. Macies extrema toti corpori formam eripit amabilem; digiti manuum semilucidi fiunt; ungues curvantur; pedes œdema occupat; per omnia membra serpit frigus, et sudor, conatus ferè ultimus cordis, passim, circa caput præcipuè, digitosque manuum summos, manare aut potiùs flare videatur. Nunc mors in limine adest.

CAUSÆ REMOTÆ.

CAUSÆ remotæ alicujus morbi, vulgò in Prædisponentes et Excitantes dividuntur. De prædisponentibus primò breviter tractandum est; et prout ad conformationem corporis, ad feminium hæreditarium, atque ætatem, spectant.

Quandam corporis conformationem, morbum, de quo agimus, quasi proprium sibi vindicare, nemini dubitandum est. In iis homi-

B

nibus

nibus maximè valet, quibus procera fit statura, longa cervix, præcordia depressa, elatique humeri. Sæpe autem thoracis deformitate ex spina, et costis malè curvatis, sternoque propiùs in positionem horizontalem redactò, Phthisis víget. Hæc enim figura, pulmones in angustiam cogit, eorumque motus minùs faciles reddit. Hinc plethora pulmonum, obstructions, &c. glandularum lymphaticarum, oriuntur. Qui porrò huic morbo sunt proni, iis haud rarò mens varia et mutabilis est, animi sensibilitas, et summum ingenii acumen.

Seminium a parentibus traditum esse, omnes ad unum consentiunt. Multis etiam placuit, hanc labem hæreditariam esse scrofulosam, et scrofulam et phthisin eundem esse morbum, varias partes corporis afficientem. Opinio hæc fanè verisimilis est; duo enim morbi multa inter se communia habent. Eædem sunt causæ excitantes, eadem corporis conformatio, idem vultus eximius; genæ rosæ; columnæ nasi tumidæ; labii superioris tumor atque fissura; iidem capilli molles, sæpe al-

bidi,

bidii, aut flavi coloris; eadem lævis cutis, musculi flaccidi; idem denique totum corpus nitidum et formosum: Præterea, iidem homines, eorumque parentes et propinqui, nunc scrofulâ nunc phthisi laborant.

Ætatem, quæ maximè huic morbo faveat, inter quindecim et triginta pluresve annos, jacere videtur. Validis autem causis excitantibus, phthisis citiùs aut ferius valere potest. Cel. GREGORIUS puellam undecim annos natam, quum rubeolâ laborâisset, phthisi captam esse memorat; atque etiam senes hoc morbo tabescere vidit.

CAUSÆ EXCITANTES.

HÆMOPTYSIS, vulnere pulmonum per primam intentionem non fanescente, ulcus et phthisin efficere traditur. Quoties autem hæmoptysis a causa externa vel interna extitit, immo quoties per longam vitam omninò
fine

sine phthisi, (ut multis exemplis confirmare possem), iterum iterumque recurrit? Ab hac igitur stirpe, ut opinor, non nisi quodam statu corporis cachectico, adhuc ignoto, enascitur phthisis pulmonalis. Et si tuberculæ adsint, potius comes et effectus, quàm causa, habenda est.

Catarrhus, qui plerumque mitis est morbus, citò suâ sponte abiturus, rarò aut nunquam phthisis causa esse videtur. Fieri autem potest, ut hic morbus in inflammationem pulmonum, et suppurationem, transeat, aut, quod magis credo, pulmonibus sæpe et violenter agitatis, tubercula gignantur, augeantur, vel inflammentur. Quinetiam pulmones et cutis, officio communi, viz. cujusdam vaporis ejiciendi, funguntur. At in catarrho, cutis constricta est, perspiratio suppressa, aut magnoperè imminuta. Fluida igitur, transitu per cutim clauso, in pulmones majore copiâ irruunt, et si non citò exhalantur, plethoram creent, acrida fiant, pulmonibus irritationem, tuberculisque originem præbeant. Sed ca-
tarrhus

tarrhus et phthisis incipiens, interdum adedò similes sunt, ut alter ab altero haud facilè dignoscitur; et tussis utriusque morbi sæpe ab eadem causa oritur, scil. frigore corpori applicato.

Pneumonia, si in vomicam transeat, hujus morbi causa esse, fertur. At certè scimus, phthisin ex vomica in bronchias rumpente minimè necessariò oriri; pus enim fatis mite et laudabile sæpe effunditur, omne excreatur, ulcus sanatur, et pulmones ut antea se bene habent: Ulcus in pulmonibus igitur fortasse non heclicæ fons erit, nisi seminium phthisicum puri quandam acedinem præbuerit.

Asthma, ut multi putant, alia est causa phthisi pulmonali. At plurimis qui asthmate laborare solent, non phthisis, sed longa et matura senectus, mortem conscivit. Asthma autem, si non causa, saltem aliis causis haud parvo erit auxilio.

A *tuberculis* rarò, hìc et illic per parenchyma pulmonum dispersis, ramulos trachæ et vasa comprimantibus, atque in inflammationem

nem et suppurationem facillè transeuntibus, tuffim et febrem hecticam, omniaque cætera mala, perfæpe oriri, nemo negare potest. Pulmonibus ita affectis rimatis, hîc inveniuntur tubercula; quæ incisa, substantiam gypseam, steatomatosam, melleam, vel subtendineam, ostendunt; hîc apparent multæ cavitates parvæ, interdum tantùm una vel duæ vomicæ amplæ, fluida varii coloris et crassitie continentes, clausæ, vel in bronchias rumpentes. Interdum etiam, non solùm pauci noduli, seminum milii aut fabæ similes, sed totus lobus durus et schirrosus perspici possit. De tuberculorum origine, ita loquitur MORTONUS* :
“ Quantùm mihi adhuc, vel a cadaverum inspectione, vel ipsâ ratione, assequi contigit, tuberculum crudum nascitur ab obstructione aliqujus glandulosæ partis; ubi, scilicet, plus lymphæ, seu seris, a sanguine fecernitur, quàm per ductum glandulæ excernitur; quo fit ut pars affecta ab incluso sero nimis distenta, naturali

* Vid. vol. ii.

turali suo tono privatur, atque inde influens, seu secretum, serum excernere ulterius nequit; ita etiam inclusa lymphæ, non amplius a novo influente sero renovata, paulatim siccescit, atque indurescit; unde oritur renitens quædam durities, seu tuberculum, quod, (ut alio loco legimus), licet progressu temporis in mollem fatis grandem succrescat, non tamen illico inflammatur, vel putrescit, usquedum, scil. acrimonia ab humore contracta in cystide, vel ex tono partis nimis dilento, inflammatio, atque inde apostema, ab aliquo accidente superveniat."

Causæ, quæ tubercula procreant, variæ enumerantur; viz. acrimoniæ variolæ, rubcolæ, scorbuti, syphilis, &c. quæ glandulas per quas transeant, irritare, et tuberculis viam sternere, habentur. Variæ etiam materiæ cum spiritu inhalatæ, vel calculi internè generati, quasi mechanicè pulmonibus irritandis, tubercula producere, ab omnibus scriptoribus traduntur.

Celeberrimo GREGORIO * persuasum est,
 —————
 omnes

* In Prælect. Acad.

omnes causas supradictas, non nisi quodam feminio auxiliante, tubercula gignere posse; hoc autem feminium, nihil aliud quàm labem scrofulosam, quæ alio tempore cervices, alio pulmonum glandulas, exercere gaudet. De hac re, hæc sunt verba CULLENI, quibus nullis rectiùs uti possum: “ It is very probable, that the acrimony which thus discovers itself in the ulcers, existed before, and produced the tubercles themselves, and it is to this acrimony that we must trace up the cause of the phthisis following these tubercles. This acrimony is probably in different cases of different kinds. In one case, and that too a very frequent one, of phthisis, it appears, that the noxious acrimony is of the same kind with that which prevails in the scrofula. This may be concluded from observing, that a phthisis, at its usual periods, frequently attacks persons born of scrofulous parents; that very often, when the phthisis appears, there

occur,

* Vide “ First Lines,” vol. ii.

occur, at the same time, some lymphatic tumors in the external parts: and very often I have found, (dicit idem auctor), the tabes mesenterica, which is a serofulous affection, joined with the phthisis pulmonalis. To all this I would add, that even, when no serofulous affection has either preceded or accompanied a phthisis, this last however most commonly affects persons of a habit resembling the serofulous.”

Ingenios. *BEDDOES**, hujus morbi, novam theoriam proponit, multoque acumine defendit. Huic eruditissimo medico persuasum est, omnia signa, quæ phthisin adesse notant, ex hyper-oxygenato statu corporis nasci. Ad hanc opinionem confirmandam, inter alia, his utitur argumentis: Mulieres phthisi laborantes, quamdiu gravidæ sunt, tamdiu sæpe prosperâ valetudine fruuntur; at, partu edito, denuo in hunc fatalem morbum incidere solent. In gravidis autem, ut *BEDDOES*

C putat,

* Vid. ejus Med. Observ.

putat, ex magnâ copiâ ad fœtum misâ, multò minùs oxygenii adeste oportet. Rutilus et vividus genæ rubor circumscriptus, Anglicè “*hectic flush*,” alii est argumento. Color rubicundus labiorum, linguæ, faucium, et caruncularum lachrymalium, peculiaris floridus sanguinis color ex phthificis missi, experimenta a FOURCROY facta, qui cum gas oxygenium phthificis inhalandum dederit, omnia ingravescere, oxygenio autem omisso, phthisin ut antea mitem fieri invenit. Experimenta quoque a LAVOISIER et ipso instituta, quæ omnia animalia, gas oxygenium inspirare coacta, haud multò pòst, febribus synochis, aliisque morbis inflammatoriis affligi, et si gas atmosphericum non admiffum erat pro certò mortem obiri, nos faciunt certiores. Omnia hæc, BEDDOES judicante, corpus phthificum, plùs satis oxygenii esse saturatum, planè arguere videntur. Porrò, LIND teste, scorbutus rarò phthificos invadit, quia, ut BEDDOES putat, diathesi scorbuticæ est minùs oxygenii quàm phthificæ opus est. At omnia, quibus hanc
opinionem

opinionem vult confirmare, argumenta exponere, certè longiùs provehar. Theoria hæc, an vera an falsa sit, dicere non meum est, ut qui in re medica adhuc inexpertus sum.

Opinionem CULLENI, hecticam, nisi ex quâdam acrimoniâ ulceribus absorptâ, nunquam oriri, experientia parùm confirmare videtur. Hecticæ enim, quum ulceris signa sunt nulla, exempla quotidie observanda. Illustrissimus GREGORIUS*, exemplum memorat talis hecticæ in puellâ, quæ, viribus diarrhœâ prostratis, tandem hâc febre correpta fuit. Ipse etiam hecticâ a pneumonia ortâ laboravit; expectoratio autem purulenta nulla, et minima quæ aderat, lucida, amyloque erat similis. Quinetiam phthificorum, quibus, præter expectorationem purulentam, omnia erant signa, haud defunt exempla. Diabete hæmorrhagiâ, aliisque morbis, qui veluti corpus exhauriunt debilitantque, haud rarò hectica oriri videntur.

* In Prælect. Acad.

denda est. Nec semper purulentiam a can-
 cere, scrofulâ, aut vulnere natam, hæc febris
 sequitur. Sed de hac re quid opus est verbis?
 Quoniam alia sententia est alio medico; nonne
 originem, vel causam proximam hujus febris
 mortiferæ, atrâ caligine adhuc esse submersam,
 nobis, quanquam invitò, confitendum est?

DIAGNOSIS.

Ab omnibus aliis morbis, catarrho excepto,
 signis præeuntibus, et conjunctis observatis,
 phthisin cuique medico dignoscere licet.

Sed catarrhus et phthisis incipiens, inter-
 dum adeò sunt similes, ut etiam solerti medi-
 co, diagnosi valdè difficilis sit. Catarrho
 hæc plerumque sunt signa: Tussis humida,
 coryza, respiratio satis libera, dolor pectoris
 aut nulla aut levis, decubitus in quovis latere
 facilis; febris, si ulla adsit, synocha.

Phthisi

Phthisi autem tussis sub initio sicca et brevis est, dyspnœa, dolor, et in thorace pondus. Præterea languor, debilitas, et, morbo provectiore, macies, anorexia et febris typhodes, phthisin adesse planè demonstrant.

At catarrho diu manente, expectoratio fieri purulenta videtur. Quibus signis igitur, aliquis rogat, mucum catarrhalem a pure phthifico discernere possumus? Signa multa quidem scriptoribus memorata sunt, quæ tamen nullam certam diagnosin præbent.

Hæc signa diagnostica vulgò enumerantur: mucus lucidus est, plerumque tenuis, pus semper opacum et crassum. Mucus in aqua natat, haud facilè dispertitur, sed in massas conglomeratur. Pus, e contrario, petit fundum, et, aquâ agitâtâ, quasi in flocculos frangitur; mucò nullus est odor, puri fœtor sæpe intolerabilis. Si materia expectorata colore et crassitie variat, partim lucida et opaca, partim flava et viridis, partim tenuis et crassa, partim denique sanguine striata, pus habenda est.

A chemicis experimentis a CAROLO DARWIN institutis, alia signa diagnostica memorata sunt. Ex his experimentis, acidum vitriolicum mucum et pus, at faciliùs priorem, solvere fertur; et cum tali solutione si aqua admixta fuerit, mucum, aut natare, aut in flocculos dividi, et in liquore suspendi; pus autem imum petere, vel solutione agitâtâ, liquorem ubique fieri turbidum. Causticam ammoniam, mucum et plerumque pus dissolvere, eadem experimenta probant; et aquam tali solutioni additam, pus, sed non mucum, præcipitare posse. Hæc autem experimenta chemica, ut GREGORIUS et alii solertissimi medici opinantur, hunc esse mucum, illud pus, signa minima certa præbent, et nos in dubio ut antea relinquunt. Ex aliis igitur signis hæcticam comitantibus, quorum non defunt multa, haud purulentâ expectoratione solâ, phthisin pro certo adesse concludere debemus.

PROGNOSIS.

Huic morbo imminente, artem nostram sæpe prosperè obviam ire, impetu autem facto, rarò aut nunquam victoriâ potiri posse, omnes medicos ingenuos agnoscere decet. In phthisi incipiente, prognosis semper anceps est; in confirmata plerumque infauſta. Nonnulli verò hoc morbo correpti, et in ultimo lethi discrimine diu versati, nihilominus in pristinam valetudinem redierunt. Si alicui vires haud multùm erint imminutæ, seminium parùm manifestum, appetitus cibi manserit, quamquam tussis, dyspnœa, et dolor pectoris interdum vexaverint, de tali non omninò adhuc desperandum est. Si autem labes erit hæreditaria, febris hæctica, diarrhœa, sudores colliquativi, macies summa, et debilitas, sine dubio de ægro infelici actum est. Quum igitur an exitus faustus, vel infauſtus sit futurus, judicare velimus; utrùm signa mitia an gravia sint, nuper accesserint,

accefferint, vel jamdiu manferint, ante omnia, utrùm feminium hæreditarium feſe oftenderit, nobis fedulò animadvertendum eſt.

RATIO MEDENDI.

RATIO hujus morbi medendi, in tres partes dividi poteſt, quibus hæc nomina indita ſint : Ratio Prophylactica, Curativa, et Palliativa.

PROPHYLACTICA.—Qui nimis lautè et liberè, vel nimis parcè et duriter, vivere ſolent, ii æquè huic morbo ſunt proni. Quoties enim liberos divitum, fatiſ nitidos et pingues, in phthiſin incidere videmus? Quoties pauperum natos, tumoribus ſcrofulofiſ, tabe meſentericâ, vel phthiſi ipſo, languere et mori?

Victus plenior corpus onerat, plethoricum, et morbis phlogiſticis aptius reddit. Victus durior corpus debilitat, inanit, aëriſ mutationi ſenſibilius facit, fluida corrumpit, et feminio
ſtrumofò

strumoso magnoperè favet. Cibo igitur uti, partim animali, partim vegetabili, omnium phthysicorum interest.

Minùs huic morbo proclives sunt omnes qui multùm sub divo vivunt, rusticis exercitationibus delectantur, medico labore utuntur. Ingenios. BEDDOES * dicit, carnarios, nautas, piscatores, aratores, pastores, phthysi minimè deditos esse. “ Certain classes (inquit) are less liable than others to consumption, either because the exhalations to which they are exposed, preserve the lungs in a healthy state, or, because they acquire, from their mode of life, a habit less susceptible of the complaint.”

Omniibus, e contrario, qui occupationes sedentarias exercent, qui otiosè sub tectis vitam agunt, qui studiis nocturnis gaudent, morbus, de quo agitur, magnoperè pertimescendus est. “ Hic enim modus vitæ, (ut CELSUS ait), corpus effœminat, nervos emollit, stomachum
D solvit.”

* Vid. “ Essay on Consumption.”

solvit.” Juniores igitur oportet, præsertim a phthificis natos, (ut verbis ejusdem utar), “varium habere vitæ genus, modò rure esse, modò in urbe, sæpiusque in agro, navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentiùs se exercere; siquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit.” Qui voluptati nimis student, Venerem sæpius petunt, Baccho plùs satis delectantur, ii celerrimè ægrotant et senescunt. Sin autem juniores, quibus phthificum est seminium, ita vitam transeant, sanè parva discrimina sunt lethi.

Si aliquis phthisin procul abesse velit, totum corpus lanæ semper vestiant. Talis enim vestitus fluida a pulmonibus ad cutem illicit; corpus patiens nunc frigoris nunc caloris reddit.

Præterea qui hunc morbum timeat, sæpe in balneum tepidum (ut BEDDOES et alii jubent) descendat. Unanimes ferè consensu balneum gelidum phthificis inimicum esse habetur. At balneum tepidum ex multorum sententiis,

tiis, nervos et artus non relaxat et solvit, sed potiùs firmat roberatque. BEDDOES iis, quorum propinqui phthifici mortui sunt, commendare solet, et ita dicit: "Sensible benefit is received by most of them; permanent benefit by several; injury by none." Attamen, morbo proveciore, balneo etiam tepido, ut ancipite et periculoso, haud temerè utendum est.

CURATIVA.—Si plethora et signa inflammatoria adsint, regimine antiphlogistico, frigore excepto, uti oportet. Si valdè doleat pectus, febris synocha adsit, et vires non imminutæ, sanguis mittatur, emplastrum epispasticum parti dolenti applicetur; hirudines admoveantur; opus est quoque setaccis vel fonticulis. Alvus si adstricta, solvenda est. Multùm prodest cibus ex farina, fructibus acidis, et lacte. Lac humanum, nonnulli collaudunt; alii equinum, alii asininum: aliis verò serum e lacte caprino, magis placuit. Potus sit acidus, emolliens, refrigerans.

Sed

Sed rarò res ita se habent. Nam languor, macies, aliaque signa debilitatis, phthifin sæpius comitantur. Nunc igitur victus fit generosior, nunc carne et vino opus est. Cibus denique talis esse debet, qualis facillimè concoquitur, maximè alit, minimè stimulat.

Quoniam hic morbus in quibusdam locis sæpissime, in aliis rarò aut nunquam, occurrit; quæ regio terræ phthificis maximè rideat, operæ sit pretium explorare. Cœlum nostrum septentrionale, humidum, atque in horas mutabile, sanè valdè inimicum est. Hæc feliciora sunt loca, quæ soli propiore calent, et quorum cœla minimè variant. Gallia Meridionalis, Lusitania, Italia, et insula Madairæ, ab omnibus ferè medicis laudantur. BEDDOES autem, et alii nobis persuadere volunt, has regiones, phthificis haud multùm prodesse; ibi quoque hunc morbum vigere; et Indiam solam Occidentalem et Orientalem ab hac peste prorsùs vacare. Sed complures juniores quibus hic morbus imminebat, immò etiam invaserat, in Italiam vel Galliam emigrasse,

grâsse, ibi bonâ valetudine usos esse, et phthificâ ætate peractâ, in patriam rediisse, et longam vitam hujus morbi expertam transisse, certiores facti sumus. At sæpius frustrâ in has terras transitur. Nec est quare miremur, quoniam plerumque non priùs a patria aufugitur, quàm morbus longè et latè vires, omniaque membra vastavit, et mors jam in limine adest. Si aliquis igitur phthisi aut pronus, aut eâ jam correptus fuerit, in Angliam Australem proficisci, aut si fieri possit peregrinari oportet.

Exercitatio phthificis sæpe multùm prodest. Si autem signa inflammatoria, aut magna debilitas adsint, fortasse semper est inimica. Nonnulli, phthificos, ambulare jubent; alii equitationem laudant; SYDENHAMUS etiam inquit, vehi equo tam certum esse specificum phthisi quàm hydrargyrum syphili, aut corticem Peruvianum febribus intermittentibus. Hunc autem eruditissimum medicum in hoc vehementer errare, experientia omnes confiteri cogit. CULLENUS dicit, in “*Primis Lineis,*”

neis," equitationem haud tutam esse, si quando hæmoptysi laboretur.

Ingenios. CARMICHAEL SMYTH, jactatione in sede pensili uti, phthificos hortatur, ut quæ, illo teste, motus cordis et arteriarum retardavit, immò complures ægros, viribus magnoperè confectis, in sanitatem reduxit. Sed utrùm ambulare, equitare, aut in sede pensili jactari, ægrotum jubeas, nunquam ut finas memento, se fatigare, calefacere, aut aëre frigido humidove exire domo. His rebus observatis, lenis exercitatio fortasse omnis generis phthificis profit, tussim levet, vires recreet, sanguinem ab interioribus ad cutim promoveat.

Secundum nonnullos, autem, phthificum die nocteque in cubiculo vivere, et aërem calefactum, et semper temperiei ejusdem, inspirare oportet. Illis enim persuasum est, ita commodis regionis calidioris ægrum posse frui. Exemplum unum egomet vidi, quod hanc opinionem confirmare videtur. Quædam fœmina, circiter viginti annos nata, cui labes erat hæreditaria,

hæreditaria, et habitus phthificus, tussi brevi et ficcâ, dyspnœâ, dolore sub sternò, et summo languore, per complures menses laborabat. Expertissimus medicus, eam in cubiculo includi, in temperie circiter 60° thermom. FAHR. continuò, servari jussit. Per totam hiemem ita vixit; signa phthifica paulatim fiebant meliora, donec prorsus abierunt, nec in hanc diem reverterunt.

Sed omnibus exercitationibus antehac dictis, navigatio longè præstare videtur; quippe quæ motum leniorem, temperiem æquabiliorum, præbet, nauseam ciet, et perspirationem excitat continuam. Hinc pulsus fit tardior, signaque omnia mitiora. Aër etiam, ut nonnulli volunt, ex salinâ materiâ in eo solutâ, fit salubrior. Quocunque modo phthificis navigatio profit, ab omnibus ferè scriptoribus magnoperè collaudata est. De hac re, accipe verba CELSI: “ In phthisi opus est, si vires patiuntur, longâ navigatione; si id imbecillitas non finit, navi tamen, sed non longè gestari commodissimum.” CICERO ipse exemplum
plum

plum illustre erat phthisis ita sanatæ: “Debilis,” inquit, “et marcescens, ab instante phthisi, in Asiam navigavi, et post duos annos Romam redii, summâ valetudine vicens.”

Quoniam igitur inter omnes convenit, navi vehi phthisicis esse saluberrimum; nonne hæc exercitatio sæpius et maturiùs adhibenda est?

Emetica, vel ut vomitum vel ut nauseam ciant, multi medici laudant affirmantque sæpenumerò expectorationem faciliorem et sanguinis fluxum ad pulmones reddere minorem. Certè scimus ad glandularum obstructions externarum resolvendas, præcipue ad testium inflammationem cohibendam, haud rarò esse utilissima. Sed quod valdè desiderandum est, tubercula ipsa discutere valere, experientia credere non finit. MARRYAT autem* magnoperè commendat quod appellat “vomitum ficcum,” omni mane per complures dies repetitum: e. g. “℞. antimon. tartarifat. cupri vitriolat. ā ā gr. viij. M. Divide

* Vid. “New Practice of Physic.”

de in tres partes æquales, quarum una capiatur mane ante jentaculum." Clar. autem DUNCANUS, cujus testimonium semper multi æstimandum est, emetica in multis phthisis exemplis a se adhibita, nil boni, sed potiùs malum attulisse, nos facit certiores. At si quando emeticis uti velimus, potiùs vomitus, quàm nausea longa moveatur, nec etiam illa sæpe excitetur. Nausea enim ex medicamentis orta, longè aliter se habet, ac quæ navigatione nascitur. Hæc stomachum haud rarò firmat, et appetitum creat; illa stomachum solvit, et ægrum frustrà reddit miserrimum. Si ad vomitum spectamus, ipecacuanham; si ad nauseam, antimonium tartarifatam præstare dicunt.

De usu corticis Peruviani in hoc morbo, variæ sunt opiniones. Alii medici, secretionem purulentam corrigere, hæcticam cohibere, et inflammationem cohesivam, quæ ulcera pulmonum sanat, posse creare; alii contrà diathesin phlogisticam, ideóque puris secretionem augere, expectorationem diffi-

liorem reddere affirmant. Fortasse autem signis inflammatoriis absentibus, et dyspnœâ haud multùm vexante, parvis dosibus, cortex Peruvianus, non solùm tutè sed commodè adhibeatur. Interdum clar^o. DUNCANO teste, sudores colliquativos compescere, secretionem in melius mutare, immo etiam ulcera ipsa sanare valuit.

De balsamis quoque terebinthinis et gummi-refinis, medici certare inter se gaudent. Nonnulli, præsertim FOTHERGILIUS*, omnia sine discrimine condemnant, quippe quæ nimis stimulent, hæcticam et cætera mala augeant. Multi, e contrario, hæc medicamenta, alius aliud, multùm laudant. MARRYOT, balsamum Peruvianum, gummi-ammoniacum, sed præcipue balsamum Copaibæ, aromaticis junctis, maximè commendat, atque dicit se ipsum hæcticâ, diarrhœâ, sudore colliquativo laborantem, ope vomitûs ficti et balsami Copaibæ, in pristinam valetudinem rediisse. " I repeated the dry vomiting, (inquit ille), every

* Vid. Lond. Med. Observ. vol. iv.

every morning for several days, and the balm of Copivi twice a-day, and swallowed a teacup-full of pork-broth as often as I could; in a word, I pursued the same method, which I have since recommended to thousands in the same disorder, with the same success; and, in six weeks, was perfectly recovered; nor have ever since felt the slightest complaint, but at this present time of writing am as healthy and hearty a grey-headed old fellow as any in his Majesty's dominions." Noster accuratiss. DUNCANUS, SIMMONS, SAUNDERS, &c. gummi-myrrhum ante alia laudant, et ne nimis stimulet, urgente diarrhœâ, nitrum, alvo adstrictâ, chrysallos tartari conjungere solebant.

Digitalis purpurea a multis eruditissimis medicis præcipuis laudibus effertur. DRAKE, FOWLER, MACLEAN, BEDDOES, et alii, multos phthificos, in omnibus morbi stadiis, ope hujus plantæ se vidisse sanari, aut si aliquando res non ita prosperè evaserunt, tamen digitali adhibitâ, ægrum semper minùs pati, vitam longiùs protrahi, et mortem terroribus spoliatam

liatam esse declarant. BEDDOES, spe et gaudio elatus, de digitali ita exclamat: "If the subsequent harvest correspond to the first fruits, there is a cause for national rejoicing, greater and more universal than any that has ever before occurred." Hi medici aut tincturam faturatam foliorum digitalis, aut decoctionem, jubere; et corticem Peruvianam, varia aromatica, et acidum vitriolicum, vel eodem tempore, vel signis mitioribus factis, et digitali omisâ, postea adhibere solebant. Ad minuenda, si non prorsus abolenda mala, quæ ab usu liberali hujus narcoticæ sæpe oriuntur, quorum sunt nausea intolerabilis, et vomitus, dolor capitis, vertigo, læsa visio, pulsus maximè tardus, debilis et irregularis, tinctura opii, acida, præsertim succus limonis, utilissima inveniebantur. De virtutibus hujus medicamenti, variæ sunt sententiæ; quum alii ad sidera evehunt laudibus, alii haud flocci æstimant. Fortasse autem medio tutissimi ibimus, et his verbis MACLEAN unius ex ejus fautoribus, nil melius nec verius dicere possumus:

sumus : “ Upon the whole, then,” inquit ille candidus et ingenios. medicus, “ the foxglove will be found a valuable remedy in consumption. It will sometimes cure when the most approved remedies fail. When of itself it is insufficient to subdue the disease, it will prove a valuable auxiliary to other means. It has always with me quieted and soothed the patient more or less ; and, where it ultimately failed, it lengthened the duration of life, and smoothed the avenues of death. This is all, I apprehend, it will be found capable of performing ; but this is doing a great deal. Those who expect wonders from it, or that it will in general cure consumption, will be disappointed.”

Pro digitali BEDDOES uti marrubio nuper proposuit, ut, quod tutius fit, omnesque virtutes digitalis in se habeat.

De variis gasibus, ut hydrogenio, acido carbonico,—et vaporibus, ut resinarum et ætheris vitriolici,—inhalandis, tempus loqui non finit. Gas autem acidum carbonicum, silen-
tio

tio præterire non possum, ut qui complures
audivi phthificos ope ejus aëris sanari, et qui
exemplum memorabile narrare volo. Hunc
casum nuper accepi a quodam ex meis ami-
cis, chirurgo eruditissimo solertissimoque RO-
BERTO BRIGGS, qui testem ejus veritatis nos-
trum clarum DUNCANUM nuncupat. Verba
igitur hujus chirurgi Latinè reddo: “ Quæ-
dam mulier, ætatis novemdecim, capillis ru-
bris, et habitu tenuiore, nuper in matrimo-
niam ducta, quum ad septentrionem faceret
iter, mense Septembris anno MDCCXCVIII, fig-
nis catarrihi correpta. Per aliquod tempus
postquam ad Edinburgum redierat, hæc signa
fatis mitia erant, tandem deteriora fiebant,
vehementi febri, capitis pectorisque dolore
comitantibus. Compluribus diebus res ita
se habebant, donec copiosa expectoratio fla-
vi coloris, et sanguine striata, supervenit, et
ad idus Novembris manebat imminuta.
Nunc verò ægra summâ debilitate, diarrhœâ
colliquativâ, et febre hecticâ laborabat; ex-
pectoratio quoque erat difficillima. Varja
remedia

remedia a nostro DUNCANO et ROBERTO BRIGGS frustra adhibita sunt; omnia ad pe-
jora indies ruebant, et mors citò appropin-
quare videbatur. Carbonicum acidum gas,
velut ultima spes, in pulmones inhalari jussum
est. Haud amplius unâ nocte, a tali aëre in-
spirato, expectoratio in melius mutata est,
diarrhœa minus urgebat. Per complures dies
paulatim vires auctæ erant, nec vehementi
diarrhœâ, nec flavâ expectoratione redeunte;
aëre fixo autem omisso, signa deteriora, ite-
rum inhalato, ut antea meliora facta sunt.
Aërahoc gase oneratum usque ad Januarium
inspiravit; tunc temporis medico haud longius
opus erat: Phthifica pristinam valetudinem
recuperaverat, et in hunc diem, secundâ ut
antea fruitur. Gas hoc modo abundè suppe-
ditabatur; globo e creta facto, in pelvem in-
ter aquam posito, identidem cochlearium aci-
di sulphurici diluti additum erat. Hæc mu-
lier in cubiculo inclusa erat, et interdum
noctu pelvis cum creta in lecto posita, et mi-
rabile dictu, vapores, aliis inimici, ægræ
fatis

fatis jucundæ erant.” Hoc exemplum phthi-
feos ope aëris fixæ sanatæ, summâ auctorita-
te comprobatum, sat mihi est memorâsse.

PALLIATIVA.—Si contra phthifin frustrâ
pugnatum fit, et de ægro infelici desperan-
dum, saltem, mala lenire, ab ærumnis perfu-
gium et solatium præbere, et viam lethi quàm
minimè tetram reddere, nos summâ ope niti
decet. Ægro miserrima sunt præcipue, tuf-
fis et dyspnœa, dolores per pectus, interdum
per totum corpus lancinantes, sudores, et diar-
rhœa.

Ad tuffim et dyspnœam mitigandam, varia
expectorantia adhibeantur. Noster illust.
RUTHERFORD, multùm laudat scillam, cum
gummi-ammoniaco conjunctam. Omnibus
aliis autem opium longè præstat. Nonnulli
opio uti timent, ne diathesin phlogisticam au-
geant, expectorationem cohibeant, sudoresque
reddant majores. Sed si opium, quod inter
omnes convenit, a miseriis requiem et som-
num

DE PHTHISI PULMONALI. 41

num ægro præbet, plùs boni quàm mali semper afferet, et sine metu adhibendum est.

Ad dolores lancinantes compescendos applicentur fots, emplastra aut hirudines. His autem frustrà adhibitis, ad opium confugere oportet.

Ad sudores reprimendos si diathesis inflammatoria non erat magna, multùm profuit cinchona. Magnoperè adjuvant varia acida, præter alia acidum vitriolicum. Interest quoque ægrì, ut lecto quàm paucissima sint stragula, et ut ipse primo mane assurgat.

Ad diarrhoeam cohibendam, creta, alumen, gummi kino, terra Japonica, et opium, sunt utilissima. Et nulli fortasse secundum locum tenet infusum catechu thebaicum.

F I N I S.

